

Injektionsvæske Gonal-f

Dosering ved fertilitetsbehandling

En injektion, 50 – 150 i.e. (internationale enheder) i underhuden om aftenen i flere dage med direkte start fra 3. cyklusdag eller fra 8. cyklusdag efter anden forudgående stimulationsbehandling (f.eks. Letrozol).

Formål

Bruges til at fremkalde stimulere vækst og modning af en eller flere ægblærer. Der tilstræbes 1-4 modne ægblærer pr. cyklus, afhængig af kvindens alder. Indholdet er identisk med det naturlige hormon FSH (FolikkelStimulerende Hormon).

Bivirkninger

Nedenfor fremgår de af Lægemiddelstyrelsen registrerede mulige bivirkninger. Risikoen for overstimulation af æggestokkene er lille. Ved inseminationsbehandling er hormonstimulationen let til moderat, modsat kraftig hormonbehandling ved reagensglasbehandling. Vi ser sjældent bivirkninger med de her anvendte doser.

Hyppighed	Bivirkning
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Reaktioner og ubehag på indstiksstedet. Hovedpine. Cyster på æggestokkene.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Vægtøgning. Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed. Udposning på blodåre. Brystspænding, Udvikling af bryster hos mænd. Acne. Overstimulation af æggestokkene.
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.	Blodprop i de dybe vener, Forværret astma. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner.