

Injektionsvæske Menopur

Dosering ved fertilitetsbehandling

En injektion, 75 – 150 i.e. (internationale enheder) i underhuden om aftenen i flere dage med direkte start fra 3. cyklusdag eller fra 8. cyklusdag efter anden forudgående stimulationsbehandling (f.eks. Letrozol).

Formål

Bruges til at fremkalde stimulere vækst og modning af en eller flere ægblærer. Der tilstræbes 1-4 modne ægblærer pr. cyklus, afhængig af kvindens alder. Indholdet er identisk med de naturlige hormoner LH (Luteiniserende Hormon = ægløsningshormon) og FSH (FollikelStimulerende Hormon).

Bivirkninger

Nedenfor fremgår de af Lægemiddelstyrelsen registrerede mulige bivirkninger. Risikoen for overstimulation af æggestokkene er lille. Ved inseminationsbehandling er hormonstimulationen let til moderat, modsat kraftig hormonbehandling ved reagensglasbehandling. Vi ser sjældent bivirkninger med de her anvendte doser.

Hyppighed	Bivirkning
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Reaktioner og ubehag på indstiksstedet. Kvalme, Mavesmerter, Oppustethed. Bækkensmerter. Hovedpine. Overstimulation af æggestokkene.
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.	Blodprop i de dybe vener.
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.	Allergiske reaktioner.