

Tablet Trisekvens

Dosering ved fertilitetsbehandling

1 tablet i 28 dage.

Formål

Bruges til at fremkalde afstødningsblødning, forud for hormonbehandling.

Bivirkninger

Nedenfor fremgår de af Lægemiddelstyrelsen registrerede mulige bivirkninger. Trisekvens anvendes som regel i årevis som hormontilskud til kvinder efter overgangsalderen. Vi ser sjældent bivirkninger med den korte behandlingstid.

Hyppighed	Bivirkning
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Brystspænding, Smerter i brysterne.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Godartet svulst, Kraftesløshed, Vægtøgning. Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Oppustethed. Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen. Forstørrede bryster. Rygsmarter. Benkrampes, Depression, Hovedpine, Migræne, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed. Betændelse i skeden, Blødning fra skeden, Godartet knude i livmoderen, Svampeinfektion i skeden, Udflåd.
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.	Angst. Hårtab. Overfølsomhed. Fortykkede slimhinder i livmoderen.
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.	Blodprop i de dybe vener, Blodprop i lungerne.
Ikke kendt.	Svulster i leveren*. Brystkræft*. Alvorlig hudreaktion*. Kræft i livmoderen*, Livmoderhalskræft*.