

## Tablet Cabergolin 0,5 mg

### Dosering ved fertilitetsbehandling

¼ til 1 tablet om mandagen i hver uge justeret efter blodprøve for prolaktin. Stoppes ved graviditet.

### Formål

Bruges til at dæmpe hormonet prolaktin, hos kvinder, der producerer for meget af dette hormon. Overproduktion af prolaktin nedsætter fertiliteten. Prolaktin er ofte forhøjet i forbindelse med højt insulin. Da dette også behandles, kan Cabergolin ofte udtrappes hurtigt og stoppes helt ved graviditet.

### Bivirkninger

Nedenfor fremgår de af Lægemiddelstyrelsen registrerede mulige bivirkninger. Ved kortvarig behandling med lave doser er bivirkningerne oftest milde og forbigående. Oversigten viser bivirkninger ved langtidsbehandling. Vi ser få bivirkninger med Cabergolin med den lave dosis og oftest korte behandlingstid.

Hyppighed	Bivirkning
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Kraftsløshed. Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter. Betændelse i hjertets hinder, Hjerteklappidelse, Væskeansamling omkring hjertet. Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Forstoppelse, Opkastning. Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk. Hedeture, Smerter i brysterne. Depression, Døsighed.
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.	Ardannelse. Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød. Benkramper, Besvimelsesanfald, Pludselig søvnanfald, Ændring i hudens følesans. Synsforstyrrelser.
Ikke kendt.	Arvæv i lungerne, Betændelse i lungehinderne, Hjertekrampe, Væskesamling i lungehinderne. Aggressivitet, Hallucinationer, Rysten, Spillelidenskab, Øget seksualdrift.