

## Tablet Provera

### Dosering ved fertilitetsbehandling

2 tabletter om aftenen i 10 dage.

### Formål

Bruges til at fremkalde afstødningsblødning, forud for hormonbehandling.

### Bivirkninger

Nedenfor fremgår de af Lægemiddelstyrelsen registrerede mulige bivirkninger. Provera anvendes i andre sammenhænge i meget større dosis i lang tid. Vi ser sjældent bivirkninger med den lave dosis i den korte behandlingstid.

Hyppighed	Bivirkning
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Kvalme. Hovedpine, Humørsvingninger. Blødningsforstyrrelser.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Feber, Træthed, Vægtøgning. Diarré, Forstoppelse, Leverpåvirkning, Opkastning. Brystspænding, Smerter i brysterne. Depression, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed. Acne, Hudkløe, Hårtab, Nældefeber. Overfølsomhedsreaktioner. Nedsat sexlyst, Udflåd.
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.	Blodprop i lungerne, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke kendt.	Blodpropper, Årebetændelse. Nedsat følsomhed over for glucose. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Nedsat evne til at få børn, Udebleven menstruation. Blodprop i nethinden.